

2.9 Lösung Vorwissenstest

	richtig	falsch
1. Das Becken wird unterteilt in das große Becken und das kleine Becken.	☒	☐
2. Der Arcus pubis der Frau beträgt zwischen 90 und 95 Grad.	☒	☐
3. Die Conjugata vera obstetrica ist die engste Stelle in der Beckenmitte.	☐	☒
4. Der Beckeneingangsraum ist queroval.	☒	☐
5. Die Interspinalenebene befindet sich im Beckeneingang.	☐	☒
6. Der Längsdurchmesser des knöchernen Beckenausgangs verläuft vom Promontorium zum Unterrand der Symphyse.	☐	☒
7. Der Uterus liegt vollständig im Bauchraum, die Cervix liegt in der Beckenhöhle.	☒	☐
8. Der Halteapparat des Uterus umfasst: – ventral das Ligamentum teres uteri und das Ligamentum vesicouterinum, – kaudal das Ligamentum latum uteri bzw. das Ligamentum cardinale, – dorsal das Ligamentum sacrouterinum.	☒ ☐ ☒	☐ ☒ ☐
9. Das knöcherne Becken besteht aus folgenden Knochen: – Os pubis (Schambein), Ossa ischii (Sitzbein), Ossa ilii (Darmbeine), Os sacrum (Kreuzbein); – Ossa coxae (Hüftbeine), Os sacrum (Kreuzbein), Os coccygis (Steißbein).	☐ ☒	☒ ☐
10. Das Promontorium ist ein Vorsprung der Zwischenwirbelscheibe des ersten Sakral- und des sechsten Lendenwirbels.	☐	☒
11. Der Beckenboden besteht aus drei Muskelschichten: – Diaphragma pelvis, – Diaphragma urogenitale, – äußere Muskelschicht des Beckenbodens.	☒ ☒ ☒	☐ ☐ ☐
12. Das Diaphragma urogenitale ist eine muskulös-sehnige Platte, die sich als Dreieck im Schambogenwinkel zwischen den beiden Schambein- und Sitzbeinästen befindet.	☒	☐
13. Das Diaphragma pelvis ist die innere Muskelschicht des Beckenbodens, die aus den folgenden Muskeln besteht: – Musculus levator ani mit den 3 Muskelanteilen: Musculus puborectalis, Musculus pubococcygeus, Musculus iliococcygeus; – Musculus coccygeus (auch Musculus ischiococcygeus).	☒ ☒	☐ ☐
14. Das Perineum ist der Weichteilbereich zwischen der hinteren Kommissur und dem After.	☒	☐